

Splenda[®]

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO



GLUCOSA EN AYUNO NORMAL EN ADULTOS: 70-100 MG/DL

RANGOS NORMALES DE GLUCOSA EN EMBARAZADAS: <92 MG/DL

PREDIABETES

Glucosa en plasma en ayuno: 100-125 mg/dL (glucosa en ayuno alterada)

Glucosa 2 h después de carga de 75 g (POTG): 140 -199 mg/dL (intolerancia a la glucosa)

HbA1c: 5.7-6.4%

DIABETES MELLITUS

Glucosa en plasma en ayuno: ≥ 126 mg/dL

Glucosa 2 horas después de carga de 75 g (POTG): ≥ 200 mg/dL

Glucosa al azar: ≥ 200 mg/dL (en presencia de síntomas)

HbA1c $\geq 6.5\%$

Para la diferenciación de diabetes tipo 1 y 2, se recomiendan pruebas que detectan anticuerpos contra insulina, anti- GAD, anti células de islotes

DIABETES GESTACIONAL

Glucosa en ayuno: >92 mg/dL

Glucosa tras carga de 75 g (POTG):


1 hora: 180 mg/dL

2 horas: 153 mg/dL

Tamiz de dos pasos:

POTG con 50 g a 1 hora: >130 mg/dL

POTG con 100 g, cuando el paciente está en ayunas: 180 mg/dL a 1 hora, 155 mg/dL a 2 horas, 140 mg/dL a 3 horas



Referencias:

1. International Diabetes Association. IDF Diabetes Atlas. 8 ed. Bruselas: International Diabetes Federation; 2017
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Diabetes Care 2021;42(Suppl. 1): S7-S12